



## مجموعة سوپربيب® لتحضير الأمعاء

كبريتات الصوديوم، وكبريتات البوتاسيوم،  
وكبريتات المغنيسيوم) محلول فموي  
(17.5 جم/3.13 جم/1.6 جم) لكل 6 أونصات

سينفذ الإجراء الذي ستخضع له الطبيب:  
العنوان:  
تاريخ الإجراء: \_\_\_\_\_ ميعاد الوصول: \_\_\_\_\_ صباحًا/مساءً  
التعليقات: \_\_\_\_\_

### نظام الجرعة المقسمة (يومان)

ابدأ بالخطوة الأولى في الساعة \_\_\_\_\_ مساءً في الليلة  
السابقة للإجراء واستكمل الإجراءات كما هو مبين أدناه:

- في الليلة السابقة للإجراء (أو عندما يخبرك طبيبك أن تبدأ)، أكمل الخطوات من الأولى حتى الرابعة باستخدام زجاجة (1) واحدة 6 أونصات قبل النوم
- في صباح يوم الإجراء، كرر الخطوات من الأولى حتى الرابعة باستخدام الزجاجة الأخرى 6 أونصات



الخطوة الثانية

أضف ماء شرب بارد إلى حد 16  
أونصة في الوعاء وامزجها.



الخطوة الأولى

صب زجاجة واحدة 6 أونصات من  
سائل سوپربيب في وعاء المزج.



الخطوة الرابعة

مهم للغاية

يجب عليك شرب (2) وعاءين  
آخرين ساعة 16 أونصة من الماء  
على مدار الساعة التالية.



الخطوة الثالثة

اشرب كل السائل الموجود  
في الوعاء.

ابدأ بالخطوة الأولى في الساعة \_\_\_\_\_ صباحًا صباح  
يوم الإجراء واستكمل الإجراءات كما هو مبين أعلاه:

ملحوظة: خفف تركيز المحلول وفقًا لتوجيهات ما قبل الاستخدام.  
ملحوظة: يجب عليك الانتباه من شرب كوب الماء النهائي قبل ساعتين  
على الأقل، أو حسب التوجيهات، من تنظيف القولون.

### في اليوم السابق للإجراء...

ما الذي يمكنك القيام به:

- يمكنك تناول وجبة إفطار خفيفة أو سوائل صافية فقط؛  
الرجاء عدم تناول أي شيء في العشاء

### ما الذي لا يمكنك القيام به:

- لا تشرب الحليب
- لا تأكل أو تشرب أي شيء باللون الأحمر أو الأرجواني
- لا تشرب المشروبات الكحولية

### يمكنك شرب أي من السوائل التالية:

- الماء
- عصائر الفاكهة (بدون اللب)، ومنها التفاح، أو البرتقال،  
أو العنب الأبيض، أو التوت البري الأبيض
- شراب الليمون
- القهوة أو الشاي (لا تستخدم أي مبيض سواء أكان يحتوي  
على حليب أم لا)
- مرق الدجاج
- حلويات الجيلاتين دون إضافة الفاكهة أو أي إضافات  
أخرى (لا تستخدم أي شيء ملون أحمر أو أرجواني)

### ملحوظة:

- تُوصف مجموعة سوپربيب لتحضير الأمعاء للأشخاص  
البالغين من أجل تطهير القولون استعدادًا لتنظيف القولون
- احرص على إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما  
في ذلك الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وبدون وصفة  
طبية، والفيتامينات، والمكملات العشبية. قد تؤثر مجموعة  
سوپربيب لتحضير الأمعاء على كيفية عمل الأدوية الأخرى
- قد لا تُمتص الأدوية التي تُؤخذ عن طريق الفم بشكل  
صحيح عندما تُؤخذ في غضون ساعة واحدة قبل بدء كل  
جرعة من مجموعة سوپربيب لتحضير الأمعاء
- ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها بعد استخدام  
مجموعة سوپربيب لتحضير الأمعاء كانت الانزعاج بشكل عام،  
وانتفاخ البطن، وآلام البطن، والغثيان، والتقيؤ، والصداع
- إذا كانت لديك أي أسئلة حول تناول مجموعة سوپربيب  
لتحضير الأمعاء، فاتصل بالطبيب

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج، الرجاء الاتصال على الرقم 1-800-874-6756  
أو زيارة موقعنا الإلكتروني من خلال [www.suprekit.com](http://www.suprekit.com).

الرجاء قراءة "معلومات الوصفة الكاملة" و"دليل الدواء" المرفقين  
مع المجموعة.