

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Teléfono:
Fax:

SUPREP®
KIT PARA
PREPARACIÓN INTESTINAL
(sulfato de sodio, sulfato de potasio y sulfato de magnesio)
Solución oral

Para adultos

(17.5 g/3.13 g/1.6 g) cada 6 onzas




SUPREP Kit para preparación intestinal es un tratamiento de dosis dividida (2 días). Se necesitan ambos frascos de 6 onzas para una preparación completa.

PRIMERA DOSIS: comience el paso 1 a las _____ p. m. la noche anterior a su procedimiento y siga las instrucciones que se muestran a continuación:

Debe completar los pasos 1 a 4 usando un (1) frasco de 6 onzas antes de acostarse:

PASO 1



Vierta **UN (1)** frasco de 6 onzas del líquido SUPREP en el recipiente para mezclar.

PASO 2



Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas del recipiente y mezcle.
NOTA: diluya la solución concentrada según las instrucciones antes de usarla.

PASO 3



Beba **TODO** el líquido en el recipiente.

PASO 4



Usted **deberá** beber dos (2) recipientes más de 16 onzas de agua durante la siguiente hora.

SEGUNDA DOSIS: comience el paso 1 a las _____ a. m. la mañana de su procedimiento y siga las instrucciones que se muestran arriba:

Para esta dosis, repita los pasos 1 a 4 que se indican anteriormente usando el otro frasco de 6 onzas.

NOTA: usted **deberá** terminar de beber el último vaso de agua al menos 2 horas, o según las instrucciones, antes de la colonoscopia.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

El día *antes* de su procedimiento...

Usted **PUEDA**:

- Comer un desayuno liviano o beber **SOLAMENTE** líquidos claros; por favor, no ingiera nada durante la cena.

Usted **NO PUEDE**:

- NO beba leche.
- NO coma ni beba nada de color rojo o morado.
- NO tome bebidas alcohólicas.

Es posible beber cualquiera de estos líquidos:

- Agua
- Jugos de fruta colados (sin pulpa) incluso manzana, naranja, uva blanca o arándano blanco
- Limada o limonada
- Café o té (**NO** use ningún producto tipo leche en polvo o crema, ya sea de origen lácteo o no lácteo)
- Caldo de pollo
- Gelatina sin frutas o agregados
(NO ROJA O MORADA)

Nota:

- SUPREP Kit para preparación intestinal es un laxante osmótico indicado para la limpieza del colon en preparación para la colonoscopia en adultos y pacientes pediátricos a partir de los 12 años de edad.
- Asegúrese de informar a su médico todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. SUPREP Kit para preparación intestinal puede afectar la eficacia de otros medicamentos.
- Los medicamentos que se toman por vía oral pueden no absorberse adecuadamente cuando se ingieren menos de una hora antes del inicio de cada dosis de SUPREP Kit para preparación intestinal.
- Si está tomando antibióticos de las familias de la tetraciclina o fluoroquinolona, hierro, digoxina, clorpromazina o penicilamina, tome estos medicamentos al menos 2 horas antes y no antes de las 6 horas después de la administración de cada dosis de SUPREP Kit para preparación intestinal.
- Las reacciones adversas más comunes en adultos (>2 %) tras la administración de SUPREP Kit para preparación intestinal fueron malestar general, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
- Si tiene preguntas acerca del uso de SUPREP Kit para preparación intestinal, llame a su médico.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

SU PROCEDIMIENTO

Hora/fecha:

Lugar:

Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención médica al:

Para obtener más información sobre este producto, llame al **1-800-874-6756** o ingrese a nuestro sitio web **www.suprepkit.com**.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

Lea la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento incluidos en el kit.