

为您进行检查的医生：\_\_\_\_\_。  
地址：\_\_\_\_\_。  
检查日期：\_\_\_\_\_ 抵达时间：\_\_\_\_\_ 上午/下午  
备注：\_\_\_\_\_。

## SUPREP® BOWEL PREP KIT

(硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁)  
口服液

成人用

(17.5g/3.13g/1.6g) 每 6 盎司



### 在结肠镜检查前一日

#### 您可以做的：

- 您可以吃清淡的早餐或只饮用澄清的液体；晚餐时请不要吃任何东西

#### 您不能做的：

- 不要喝牛奶
- 切勿食用或饮用任何红色或紫色的食物或饮品
- 不要饮用含酒精的饮料

#### 可以饮用以下任一种液体：

- 水
- 滤过的果汁(不含果肉)，包括苹果、橙子、白葡萄或白蔓越莓
- 青柠水或柠檬水
- 咖啡或茶(不要使用任何乳制品或植脂末)
- 鸡汤
- 不添加水果或配料的明胶甜点(不含红色或紫色)

#### 注意：

- SUPREP 肠道准备药盒是一种渗透性泻药，适用于清洁结肠，用于成人和 12 岁及以上儿童患者的结肠镜检查准备
- 请务必告知您的医生您所服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。SUPREP 肠道准备药盒可能会影响其他药物的药效
- 如果在开始服用每剂 SUPREP 肠道准备药盒前 1 小时内口服其他药物，药物可能无法正常吸收
- 如果服用四环素或氟喹诺酮类抗生素、铁、地高辛、氯丙嗪或青霉胺，则应在服用 SUPREP 肠道准备药盒的至少 2 小时前和不少于 6 小时后服用上述药物
- 在成人 (> 2%) 中，服用 SUPREP 肠道准备药盒后最常见的不良反应为全身不适、腹胀、腹痛、恶心和呕吐
- 如果您对服用 SUPREP 肠道准备药盒有任何疑问，请致电您的医生

欲了解有关此产品的更多信息，请致电 1-800-874-6756，  
或访问我们的网站 [www.suprepkit.com](http://www.suprepkit.com)

SUPREP 肠道准备药盒为分剂量 (2 天) 给药方案。完成准备工作需要两个 6 盎司的药瓶。

**第一剂：**在您进行检查的前一天晚上 \_\_\_\_\_ PM 开始第 1 步，并按如下所示进行：

睡觉前，您必须使用一 (1) 个 6 盎司的药瓶完成第 1 至第 4 步：

#### 第 1 步



将一 (1) 瓶 6 盎司的 SUPREP 液体倒入混合容器中。

#### 第 2 步



将冷却的饮用水加至容器上的 16 盎司刻度线并混合。

**注意：**使用前，按照指示稀释浓缩液。

#### 第 3 步



将容器中的液体全部喝掉。

#### 第 4 步



**重要**  
您必须在接下来的 1 小时内再喝两 (2) 个容器的 16 盎司的水。

**第二剂：**在检查当日上午 \_\_\_\_\_ AM 开始第 1 步，并按如上所示进行：

对于此剂量，使用另一个 6 盎司的药瓶重复上述第 1 至第 4 步。

**注意：**您必须在结肠镜检查前至少 2 小时或按照指示喝完最后一杯水。

请阅读药盒中的完整处方信息和药物指南。

作为来自下列机构的教育服务而提供  Braintree  
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®