

시술을 수행하는 의사: _____
 주소: _____
 시술 일자: _____ 도착 시각: _____ 오전/오후
 메모: _____

**SUPREP®
 BOWEL PREP KIT**
 (황산나트륨, 황산칼륨 및 황산마그네슘)
 경구 용액
성인용
 6온스당 (17.5g/3.13g/1.6g)



시술 전달...

허용되는 일:

- 가벼운 아침 식사를 하거나 맑은 액체류만 마실 수 있습니다. 저녁 식사로는 아무것도 먹지 마십시오

허용되지 않는 일:

- 우유를 마시지 마십시오
- 빨간색이나 보라색의 음식을 먹거나 음료를 마시지 마십시오
- 알코올 음료를 마시지 마십시오

다음 액체류는 마셔도 좋습니다.

- 물
- 사과, 오렌지, 백포도, 또는 화이트 크랜베리를 비롯하여 (과육 없이) 걸러 낸 과일주스
- 라임에이드 또는 레몬에이드
- 커피 또는 차(유제품이나 비 유제품 크리머는 안 됨)
- 달육수
- 과일이나 고명 없는 젤라틴 디저트류 (빨간색이나 보라색은 안 됨)

- 참고:**
- SUPREP 장정결제 키트는 성인 및 12세 이상 소아 환자의 대장내시경 검사 준비를 위한 결장 세척에 사용하는 삼투성 완하제입니다
 - 복용 중인 모든 약물을 의사에게 알려 주십시오. 여기에는 처방 및 비처방 약물, 비타민 및 약초 보충제가 포함됩니다. SUTAB 장정결제 키트가 다른 약물의 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
 - 각 SUPREP 장정결제 키트의 각 용량 투여를 시작하기 전 1시간 이내에 경구 약물을 복용하면 제대로 흡수되지 않을 수 있습니다.
 - 테트라사이클린 또는 플루오로퀴놀론 항생제, 철분, 디곡신, 클로르프로마진 또는 페니실라민을 복용 중인 경우, SUPREP 장정결제 키트를 투여하기 최소 2시간 전 및 최소 6시간 이후에 이러한 약물을 복용하십시오.
 - SUPREP 장정결제 키트 투여 후 성인에서 가장 흔하게 발생하는 이상반응(>2%)은 일반적인 불편감, 복부 팽만, 복통, 메스꺼움 및 구토였습니다
 - SUPREP 장정결제 키트 복용에 관한 문의 사항이 있는 경우, 담당 의사에게 연락하십시오.

본 제품에 관해 더 알아보시려면 **1-800-874-6756**으로 연락하거나 **www.suprekit.com**을 방문하십시오.

SUPREP 장정결제 키트는 분할 투여(2일간) 요법입니다. 완전정결을 위해 6온스 병 두 개가 모두 필요합니다.

1차 투여: 시술 전달 밤 오후 _____ 에 1단계를 시작해 아래 그림과 같이 진행하십시오.

잠자리에 들기 전에 6온스 병 한(1) 개를 사용해 1~4단계를 완료해야 합니다.



SUPREP 액체 6온스 병 한(1) 개를 혼합용 용기에 붓습니다.



차가운 식수를 용기의 16온스 선까지 채우고 혼합합니다.

참고: 사용하기 전에 지시에 따라 농축액을 희석하십시오.



용기의 액체를 모두 마십니다.



다음 1시간 내에 16온스 용기로 물 두(2) 잔을 더 마셔야 합니다.

2차 투여: 시술 당일날 오전 _____ 에 1단계를 시작해 위의 그림과 같이 진행하십시오.

이 투여를 위해 다른 6온스 병을 사용해 위의 1~4단계를 반복하십시오.

참고: 대장내시경 검사 최소 2시간 전에, 또는 지시에 따라 마지막 물을 모두 마셔야 합니다.

키트에 있는 처방 정보 및 약물 지침을 모두 읽으십시오.