

Lekarz wykonujący badanie: _____
Adres: _____
Data badania: _____
Godzina zgłoszenia się na badanie: _____
Uwagi: _____

W dniu poprzedzającym badanie...

Co MOŻNA robić:

- Można zjeść TYLKO lekkie śniadanie lub wypić klarowne płyny; nie wolno jeść kolacji.

Czego NIE WOLNO robić:

- NIE WOLNO pić mleka.
- NIE WOLNO jeść ani pić niczego o czerwonym lub purpurowym zabarwieniu.
- NIE WOLNO pić napojów alkoholowych.

Można pić następujące płyny:

- Woda
- Klarowne soki owocowe (bez miąższu), w tym jabłkowy, pomarańczowy, z białych winogron lub z białych żurawin
- Lemoniada
- Kawa lub herbata (NIE używać zabielaacza na bazie mleka lub niezawierającego mleka)
- Bulion z kurczaka
- Desery zawierające żelatynę bez owoców i posypek (BEZ SKŁADNIKÓW CZERWONYCH LUB PURPUROWYCH)

Uwaga:

- Zestaw do przygotowania jelita SUPREP jest osmotycznym środkiem przeczyszczającym przeznaczonym do oczyszczania jelita grubego przed zabiegiem kolonoskopii u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 12 lat.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach, w tym wydawanych na receptę i bez recepty, witaminach i suplementach roślinnych. Zestaw do przygotowania jelita SUPREP może wpływać na działanie innych leków
- Leki przyjmowane doustnie mogą nie zostać prawidłowo wchłonięte, jeśli będą przyjęte w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania każdej dawki zestawu do przygotowania jelita SUPREP.
- W przypadku stosowania antybiotyków tetracyklinowych lub fluorochinolonowych, żelaza, digoksyny, chlorpromazyny lub penicylaminy należy je przyjąć na co najmniej 2 godziny przed przyjęciem i nie wcześniej niż po upływie co najmniej 6 godzin od przyjęcia zestawu do przygotowania jelita SUPREP.
- Najczęstsze działania niepożądane u dorosłych (>2%) po podaniu zestawu do przygotowania jelita SUPREP obejmowały ogólny dyskomfort, wzdęcia, ból brzucha, nudności i wymioty.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zestawu do przygotowania jelita SUPREP należy zadzwonić do swojego lekarza.

Informacje o tym produkcie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-874-6756 lub na naszej stronie internetowej www.suprekit.com

Należy zapoznać się z całością treści druków informacyjnych oraz instrukcji stosowania leku, które załączono do zestawu.

**SUPREP®
BOWEL PREP KIT**
(siarczan sodu, siarczan potasu i siarczan magnezu)
roztwór doustny
Dla dorosłych
(17,5 g / 3,13 g / 1,6 g) na 6 uncji




SUPREP zestaw do przygotowania jelita podawany jest w dawkach podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Należy przyjąć zawartość obu butelek (po 6 uncji), aby nastąpiło pełne przygotowanie jelita.

PIERWSZA DAWKA: Krok 1 należy rozpocząć o godzinie _____ wieczorem przed badaniem i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


Należy wykonać kroki 1 do 4, przyjmując zawartość jednej (1) butelki zawierającej 6 uncji przed pójściem spać:

KROK 1



Wlać JEDNĄ (1) butelkę zawierającą 6 uncji preparatu SUPREP do dostarczonego pojemnika.


KROK 2



Dodać do pojemnika chłodną wodę pitną do linii odpowiadającej 16 uncjom i wymieszać.


UWAGA: Przed użyciem rozcieńczyć koncentrat roztworu zgodnie ze wskazówkami.

KROK 3



Wypić CAŁY płyn znajdujący się w pojemniku.

KROK 4



Konieczne jest wypicie zawartości jeszcze dwóch (2) pojemników po 16 uncji wody w ciągu następnej 1 godziny.

DRUGA DAWKA: Krok 1 należy rozpocząć o godzinie _____ rano w dniu badania i postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami:

W przypadku tej dawki należy powtórzyć powyższe kroki 1 do 4 i użyć drugiej butelki zawierającej 6 uncji.

UWAGA: Konieczne jest wypicie ostatniej szklanki wody co najmniej 2 godziny przed kolonoskopią lub zgodnie z zaleceniami.

Dostarczone w ramach usług edukacyjnych przez

Brantree
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®

©2021 Brantree Laboratories, Inc.

012-271-v1-P

marzec 2021