

Thủ thuật của quý vị sẽ được thực hiện bởi Bác sĩ: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Ngày làm thủ thuật: \_\_\_\_\_ Đến vào lúc: \_\_\_\_\_ Sáng/Chiều

Lưu ý: \_\_\_\_\_

## SUPREP® BOWEL PREP KIT

(natri sulfat, kali sulfat và magie sulfat)  
dạng dung dịch để uống

**Dành cho Người lớn**

(17.5g/3.13g/1.6g) mỗi 6 ounce



Vào ngày *trước* ngày tiến hành thủ thuật. . .

Những việc quý vị **CÓ THỂ** làm:

- Quý vị **CHỈ** được ăn sáng nhẹ hoặc uống chất lỏng trong suốt; vui lòng không ăn gì vào bữa tối

Những việc quý vị **KHÔNG ĐƯỢC** làm:

- **KHÔNG ĐƯỢC** uống sữa
- **KHÔNG ĐƯỢC** ăn hoặc uống bất cứ thứ gì có màu đỏ hoặc màu tím
- **KHÔNG ĐƯỢC** uống đồ uống có cồn

Có thể uống bất kỳ chất lỏng nào sau đây:

- Nước lã
- Nước ép trái cây đã lọc (không có cùi) bao gồm táo, cam, nho trắng hoặc nam việt quất trắng
- Nước chanh xanh (lime) hoặc chanh vàng (lemon)
- Cà phê hoặc trà (**KHÔNG ĐƯỢC** dùng bất kỳ loại kem béo làm từ sữa hoặc không làm từ sữa nào)
- Nước súp gà
- Món tráng miệng làm bằng thạch (gelatin) không thêm trái cây hoặc đồ ăn kèm (**KHÔNG CÓ MÀU ĐỎ HOẶC TÍM**)

Lưu ý:

- SUPREP Bowel Prep Kit là thuốc nhuận tràng thẩm thấu được chỉ định để làm sạch đại tràng nhằm chuẩn bị cho nội soi đại tràng ở bệnh nhân là người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên
- Hãy báo cho bác sĩ của quý vị biết tất cả các loại thuốc quý vị dùng, bao gồm cả thuốc theo toa và không theo toa, vitamin và chế phẩm bổ sung từ thảo dược. Thuốc chuẩn bị nội soi đại tràng SUPREP có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc khác
- Những thuốc quý vị cần uống có thể không hấp thu được đúng cách khi quý vị uống trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu dùng mỗi liều thuốc chuẩn bị nội soi đại tràng SUPREP
- Nếu có dùng thuốc kháng sinh tetracycline hoặc fluoroquinolone, sắt, digoxin, chlorpromazine hoặc penicillamine, hãy dùng những thuốc này cách ít nhất là 2 tiếng trước khi dùng và cách không dưới 6 tiếng sau khi dùng thuốc chuẩn bị nội soi đại tràng SUPREP
- Các phản ứng có hại thường gặp nhất ở người lớn (>2%) sau khi dùng thuốc chuẩn bị nội soi đại tràng SUPREP là khó chịu toàn thân, chướng bụng, đau bụng, buồn ói và ói mửa
- Nếu quý vị có thắc mắc gì về việc dùng thuốc chuẩn bị nội soi đại tràng SUPREP, vui lòng gọi cho bác sĩ của quý vị

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này, vui lòng gọi số 1-800-874-6756 hoặc truy cập Trang Web của chúng tôi tại [www.suprepkit.com](http://www.suprepkit.com)


Vui lòng đọc toàn phần Thông tin thuốc theo toa và hướng dẫn dùng thuốc trong bộ thuốc.

Thuốc chuẩn bị nội soi đại tràng SUPREP là thuốc dùng theo chế độ phân liều (trong 2 ngày). Cần dùng cả hai chai, mỗi chai 6 ounce để hoàn tất liệu trình.

**LIỀU THỨ NHẤT:** Bắt đầu Bước 1 lúc \_\_\_\_\_ giờ tối, vào buổi tối trước ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng và tiến hành như hình dưới đây:


Quý vị phải hoàn thành các Bước từ 1 đến 4 bằng cách sử dụng một (1) chai 6 ounce trước khi đi ngủ:

**BƯỚC 1**



Rót **MỘT** (1) chai 6 ounce dung dịch SUPREP vào cốc trộn.

**BƯỚC 2**



Thêm nước mát đến vạch 16 ounce trên cốc và trộn đều.


**LƯU Ý:** Pha loãng dung dịch đậm đặc theo chỉ dẫn trước khi sử dụng.

**BƯỚC 3**



Uống **TOÀN BỘ** chất lỏng trong cốc.

**BƯỚC 4**



Quý vị phải uống thêm hai (2) cốc, mỗi cốc 16 ounce nước trong vòng 1 tiếng tới.

**LIỀU THỨ HAI:** Bắt đầu Bước 1 lúc \_\_\_\_\_ giờ sáng, vào buổi sáng làm thủ thuật nội soi đại tràng và tiến hành như hình trên đây:

Đối với liều này, hãy lặp lại các Bước từ 1 đến 4 như minh họa ở trên bằng cách sử dụng chai 6 ounce còn lại.

**LƯU Ý:** Quý vị phải uống hết ly nước cuối cùng tối thiểu hai tiếng, hoặc theo chỉ dẫn, trước khi tiến hành nội soi đại tràng.

Được cung cấp dưới hình thức hướng dẫn qua Braintree

A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®